

Enfermero de Salud Pública	Agencia:	Teléfono:
-----------------------------------	-----------------	------------------

La presente es para informarle sobre el tratamiento, los efectos secundarios y los riesgos de tomar medicamentos para combatir la enfermedad de tuberculosis (TB) activa. El tratamiento de la TB activa con medicamentos recetados curará la TB en la mayoría de los casos. El medicamento normalmente se debe tomar por al menos 6 meses, pero podría requerir un periodo más largo de tiempo según las instrucciones de su médico.

LLAME A SU DOCTOR/ENFERMERO: Si sufre alguno de los efectos secundarios enumerados a continuación o si tiene cualquier otra pregunta.

Medicamento	Efectos secundarios	Comentarios
Isoniacida (INH)	Orina oscura, heces de color claro, fatiga, pérdida de apetito, Náusea, vómito, dolor abdominal, ojos o piel amarilla, sarpullido, hormigueo o espasmos musculares en las manos o los pies.	Llame a su doctor o enfermero de salud pública si sufre de cualquiera de estos efectos secundarios. NO consuma alcohol por riesgo a daño al hígado. NO combine Tylenol (acetaminofén) o cualquier medicamento con Tylenol con INH. Puede tomar Ibuprofeno, Aleve o Advil. Evite los antiácidos (Maalox, Tums, Mylanta) hasta 2 horas después de tomar INH. Informe a su doctor o enfermero de salud pública si queda embarazada mientras toma INH.
Rifampicina (RIF)	Líquidos corporales de color naranja, síntomas similares a los de la gripe, náuseas, vómitos, dolor abdominal, problemas de sangrado, fiebre, heces de color claro, sarpullidos, ojos o piel amarilla, fatiga, sangre en la orina, susceptibilidad a desarrollar hematomas	NO consuma alcohol por riesgo a daño al hígado. Interacciones significativas con metadona, medicamentos anticonceptivos, digitálicos, derivados cumarínicos, anticonvulsivos, inhibidores de la proteasa, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa y muchos otros fármacos. Vuelve el color de los fluidos corporales naranja (es decir, sudor, orina, lágrimas). Podría descolorar permanentemente los lentes de contacto blandos. Informe a su doctor o enfermero de salud pública si queda embarazada mientras toma RIF.
Piracinamida (PZA)	Orina oscura, heces de color claro, ojos o piel amarilla, dolores en las articulaciones, malestar estomacal, náuseas, vómitos, fatiga, sarpullidos, fotosensibilidad, gota	NO consuma alcohol por riesgo a daño al hígado. Tome bastante líquido (agua, jugo, leche). Podría causar ácido úrico elevado. Informe a su doctor o enfermero de salud pública si queda embarazada mientras toma PZA.
Etambutol (EMB)	Cualquier cambio en la visión (capacidad para ver o para distinguir colores), sarpullidos	NO consuma alcohol por riesgo a daño al hígado. No es recomendado para niños que son demasiado jóvenes para ser monitoreados por cambios de visión. Informe a su doctor o enfermero de salud pública si queda embarazada mientras toma EMB.

He leído las declaraciones en este formulario sobre el tratamiento de la enfermedad de TB activa. He tenido la oportunidad de hacer preguntas las cuales fueron respondidas de manera satisfactoria. Entiendo los beneficios y riesgos de tomar estos medicamentos.

Nombre del cliente

____/____/____
Fecha de nacimiento

____/____/____
Fecha de hoy

Firma del enfermero de Salud Pública

El cliente recibió una copia del formulario: _____ (iniciales del cliente/enfermero)